Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 06:56

Link do produktu: https://sklep.pesan.pl/rat-killer-perfekt-kostka-fluo-5-kg-preparat-deratyzacyjny-p-14.html



RAT KILLER PERFEKT KOSTKA FLUO 5 KG - preparat deratyzacyjny

Cena brutto	**209,10 zł**
Cena netto	**170,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Producent	**BEST-PEST**

Opis produktu

RAT KILLER PERFEKT KOSTKA FLUO 5 KG - preparat deratyzacyjny

Gotowy do użycia rodentycyd w formie przynęty – kostki o wadze jednostkowej ~20g; do zwalczania myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*), na wszystkich etapach rozwoju. Produkt może być stosowany wewnątrz i wokół budynków, także publicznych i przemysłowych (w tym magazynach, dworcach, ładowniach statków), domach, piwnicach, garażach, szafach. Może być również stosowany w zakładach dystrybucji energii i środkach transportu. Dzięki formurlacji z wykorzystaniem technologii pigmentów fluorescencyjnych (FLUO-NP®) przynęta może być łatwo zidentyfikowana nawet w złych warunkach oświetleniowych, jeśli jest oświetlona lampą UV. Gdy gryzonie zjadają przynętę, preparat fluorescencyjny sprawia, że odchody gryzoni są wyraźnie widoczne w świetle UV, co daje możliwość monitorowania aktywności gryzoni. Produkt przeznaczony jedynie dla użytkowników profesjonalnych.

ZAWIERA SUBSTANCJĘ AKTYWNĄ

– Brodifakum – 0,005g / 100g

SPOSÓB UŻYCIA

Do kontroli myszy (*Mus musculus*) - do użytku wewnątrz i wokół budynków:

- Wysoka infestacja: Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną.
Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 2 m.
- Niska infestacja: Do 50 g przynęty na stację deratyzacyjną.
Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.

Do kontroli szczurów (*Rattus norvegicus*) - do użytku wewnątrz i wokół budynków:

- Wysoka infestacja: Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną.
Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5 m.
- Niska infestacja: Do 100 g przynęty na stację deratyzacyjną.
Jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 10 m.

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni, co następuje po
2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4 – 5 dniach od momentu spożycia.

UWAGA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Zagrożenia dla zdrowia:

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).
Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2)
H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
Działa szkodliwie na rozrodczość (Repr.1A)

Elementy oznakowania



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki
H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.
P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.
P260 Nie wdychać pyłu.
P280 Stosować rękawice ochronne.
P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.