

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/trutka-na-gryzonie-myszy-i-szczury-rat-killer-perfekt-kostka-20kg-p-675.html>



Trutka na gryzonie, myszy i szczury RAT KILLER PERFECT KOSTKA 20kg

Cena brutto	515,00 zł
Cena netto	418,70 zł
Dostępność	Niedostępny

Opis produktu

RAT KILLER PERFECT KOSTKA karton 20kg - preparat deratyzacyjny

Trująca jednodawkowa przynęta pokarmowa w formie kostek (błoczków woskowych) gotowa do użycia. Produkowana na bazie brodifakum – substancji czynnej z grupy antykoagulantów, skutecznej w zwalczaniu myszy i szczurów nawet po przyjęciu pojedynczej dawki. RAT KILLER PERFECT KOSTKA może być stosowany wewnątrz i wokół budynków przemysłowych (włączając w to: magazyny, składy, ładownie statków, zakłady produkcyjne), budynków inwentarskich (kurniki, indyczniki, stajnie, obory, chlewnie, mleczarnie), budynków i lokali użyteczności publicznej (hotele, mieszkania, domy, piwnice, garaże, pomieszczenia składowe) a także na zewnątrz w bezpośrednim ich sąsiedztwie (ogrody).

SUBSTANCJA AKTYWNA:

- Brodifacoum – 0,003%
- Denatonium – środek zniechęcający do spożycia przez ludzi.

ZWALCZANE ORGANIZMY SZKODLIWE:

- Mysz domowa (*Mus musculus*), osobniki młode i dorosłe
- Szczur wędrowny (*Rattus norvegicus*), osobniki młode i dorosłe
- Szczur śniady (*Rottus rattus*) osobniki młode i dorosłe

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

1. Przed zastosowaniem przynęty należy przeprowadzić wstępne rozpoznanie terenu, na którym występują gryzonie, w celu właściwej identyfikacji gatunku gryzonia, miejsc aktywności oraz ustalenia prawdopodobnej przyczyny i stopnia infestacji gryzoni.
2. Przed rozpoczęciem zabiegu należy usunąć inne potencjalne źródła pokarmu dla gryzoni (rozsypane ziarno, pozostałości żywności itp.).

-
3. Nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, gdyż może mieć to wpływ na zachowanie zwierząt i spożycie przynęty.
 4. W celu zwiększenia spożycia przynęty oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa ponownej infestacji należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze (np. zatykanie otworów, usuwanie potencjalnych źródeł pokarmu dla gryzoni).
 5. Stacje deratyzacyjne powinny być umieszczane w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów, w których zaobserwowano aktywność gryzoni (ścieżki, miejsca gniazdowania, miejsca karmienia zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).
 6. Tam gdzie jest to możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
 7. Stacje deratyzacyjne należy wyraźnie oznakować tak, aby było oczywiste, że zawierają produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować. W pobliżu punktów wyłożenia przynęty powinna znajdować się informacja, że kontakt z produktem lub padłymi gryzoniami jest niebezpieczny dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia produktem.
 8. Tam gdzie jest to możliwe zabezpieczyć przynętę w taki sposób, aby nie mogła być ona wynoszona.
 9. Należy nosić odpowiednie rękawice ochronne. Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po zastosowaniu produktu umyć ręce i skórę narażoną na bezpośredni kontakt z produktem.
 10. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i zwierząt innych niż docelowe. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni mających z nimi kontakt.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wyłożyć preparat w porcjach, najlepiej w stacjach deratyzacyjnych (lub płytkich naczyniach), w miejscach najczęściej odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż ścian, w miejscach spokojnych i suchych).

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków: 60-100g przynęty na stację deratyzacyjną. Przy niskiej infestacji, jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5m.

Zwalczanie myszy wewnątrz budynków i wokół budynków: 40g przynęty na stację deratyzacyjną. Przy niskiej infestacji, jeśli wymagana jest więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość pomiędzy stacjami powinna wynosić 5m.

Spożytą trutkę należy systematycznie uzupełniać aż do momentu całkowitego wytępienia gryzoni, co następuje po 2 tygodniach od wyłożenia trutki. Gryzonie zaczynają padać po 4-5 dniach od momentu spożycia. Aby zmniejszyć ryzyko zatrucia wtórnego, należy regularnie wyszukiwać i usuwać padłe gryzonie w częstych odstępach czasu przez cały czas trwania deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub częściej, jeśli zaistnieje taka potrzeba), pamiętając o stosowaniu rękawic ochronnych lub narzędzi np. szczypce.

UWAGA

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Zagrożenia dla zdrowia:

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub

narażenie powtarzane (krew).

Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2)

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

Działa szkodliwie na rozrodczość (Repr.1A)

Elementy oznakowania



Hasło ostrzegawcze: Niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P201 Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P260 Nie wdychać pyłu.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P308+P313 W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P314 W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P405 Przechowywać pod zamknięciem.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać do autoryzowanego zakładu utylizacji odpadów.