

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/trutka-na-gryzonie-myszy-i-szczury-rat-killer-perfekt-kostka-3kg-p-699.html>



Trutka na gryzonie, myszy i szczury RAT KILLER PERFECT KOSTKA 3KG

Cena brutto	125,46 zł
Cena netto	102,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BEST-PEST

Opis produktu

RAT KILLER PERFECT KOSTKA 3kg gotowego do użycia rodentycyd w formie przynęty.

Gotowy do użycia rodentycyd w formie przynęty – kostki o wadze jednostki ~20g; do zwalczania myszy (*Mus musculus*) i szczurów (*Rattus norvegicus*), na wszystkich wczesnych etapach rozwoju. Produkt może być poruszany wewnątrz i wokół budynków, także publicznych i przemysłowych (w tym magazynach, stacjach, ładowniach transportu), domach, piwnicach, garażach, szafach. Może być również wprowadzony w instalacji dystrybucji energii i środka transportu. Dzięki formułacji z wykorzystaniem technologii pigmentów fluorescencyjnych (FLUO-NP®) przynęta może łatwo wykryć nawet w złych warunkach oświetleniowych, jeśli jest oświetlona lampą UV. Gdy gryzonie zjadają przynętę, preparat fluorescencyjny sprawia, że odchody gryzoni są widoczne w świetle UV, co daje możliwość monitorowania aktywności gryzoni.

SUBSTANCJA AKTYWNA:

– Brodifakum – 0,005g / 100g

ZWALCZANE ORGANIZMY SZKODLIWE:

- Mysz domowa (*Mus musculus*), pochodzeniai młodego i dorosłego
- Szczur wędrowny (*Rattus norvegicus*), dziecko i dziecko
- Szczur śniadaniowy (*Rottus rottus*) pochodzeniai młodzieńczy i dziecięcy

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE STOSOWANIA:

1. Aby określić rodzaj gryzonia, należy określić rodzaj gryzonia, a także ustalić wpływ i stopień porażenia gryzoni.
2. Przed zastosowaniem należy usunąć inne źródło pokarmu dla gryzoni (rozsypane ziarno, później żywność itp.).
3. Nie należy ingerować w środowisko bytowania gryzoni, może to mieć wpływ na zachowanie zwierząt i wykorzystanie pokarmu.
4. W celu uzyskania źródła pokarmu oraz skutecznego działania skutecznej metody zapobiegania infekcji (np. zatykanie źródła pokarmu dla gryzoni).
5. Stacje deratyzacyjne muszą być umieszczane w pobliżu obszarów, w których obserwuje się aktywność gryzoni (ścieżki,

miejsca gniazdowania, miejsca udostępniania zwierząt hodowlanych, otwory, nory itp.).

6. Tam, gdzie jest możliwe, stacje deratyzacyjne należy przytwierdzić do podłoża lub innych struktur.
7. Stacje deratyzacyjne należy oznakować tak, aby było obuwie, że produkty gryzoniobójcze, i że nie wolno przy nich manipulować. W pobliżu punktów wydawania składników, które zawierają informację, że kontakt z uwagi lub padłymi gryzoniami szkodliwymi jest dla zdrowia oraz informacja o zasadach udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrucia.
8. Tam, gdzie jest możliwe znalezienie źródła w taki sposób, aby nie mogło być ona wynoszona.
9. Profesjonalne rękawice ochronne. Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Po produkcie indywidualnym i skórze narażonej na bezpośredni kontakt z częstotliwością.
10. Stacje deratyzacyjne należy umieszczać w miejscach niedostępnych dla dzieci, ptaków, zwierząt domowych, zwierząt hodowlanych i innych zwierząt niż docelowe. Stacje deratyzacyjne należy umieścić z dala od żywności, napojów i pasz dla zwierząt oraz z dala od przyborów kuchennych i powierzchni, z którymi mają kontakt.

SPOSÓB UŻYCIA:

Wysłać preparat w porcjach, najlepiej w stacjach deratyzacyjnych (lub podać naczyniach), w miejscu najczęściej odwiedzanych przez gryzonie (w pobliżu ich kryjówek i na drogach przebiegu, wzdłuż, w miejscach spokojnych i suchych).

Zwalczanie szczurów wewnątrz budynków i wokół budynków : 60-100g przynęty na dodatek deratyzacyjny . Przy użyciu infestacji, jeśli jest to więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość między stacjami powinna działać 5m.

Zwalczanie myszy wewnątrz budynków i wokół budynków: 40g przynęty na użytek deratyzacyjny. Przy użyciu infestacji, jeśli jest to więcej niż jedna stacja deratyzacyjna, minimalna odległość między stacjami powinna działać 5m.

Spożytą trutkę należy uzupełnić uzupełnić aż do chwili uruchomienia wytopienia gryzoni, co spowoduje 2 rozpoczęcie od wyłożenia trutki. Gryzonie padać po 4-5 dniach od momentu spożycia. Aby uniknąć ryzyka zatrucia wtórnego, należy regularnie wyszukiwać i usuwać gryzonie w odstępach czasu przez cały czas trwania deratyzacji (np. przynajmniej dwa razy w tygodniu lub bardziej, jeśli zaistnieje taka potrzeba), pamiętając o ograniczeniu ochrony ochronnych lub narzędzia np. szczypce.

UWAGA !

Produktów biobójczych należących do środków chemicznych. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

Elementy oznakowania

Piktogram:



Hasło ostrzegawcze: **Niebezpieczeństwo**

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zwroty wskazujące środki ostrożności:

P102 Chronić przed dziećmi

P202 Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

P280 Stosować rękawice ochronne.

P308+P313 W PRZYPADKU narażenia lub styczości: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

P501 Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z przepisami krajowymi.

Zagrożenia fizykochemiczne:

Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń

Zagrożenia dla zdrowia:

Działa szkodliwie na rozrodczość (Repr.1A)

H360D Może działać szkodliwie na dziecko w łonie matki

Działa toksycznie na narządy docelowe w następstwie powtarzanego narażenia (STOT RE 2)

H373 Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane (krew).

Zagrożenia dla środowiska:

Produktu nie zaklasyfikowano do żadnej z kategorii zagrożeń.

Inne zagrożenia:

Mieszanina nie zawiera substancji spełniających kryteria PBT lub vPvB.