



Preparat dezynfekcyjny VIRKON S 200g. Do dezynfekcji powierzchni i nasączenia mat, ZWALCZA ASF

Cena brutto	32,40 zł
Cena netto	30,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Producent	BAYER

Opis produktu

PREPARAT DO DEZYNFEKCJI VIRKON S

VIRKON S to preparat dezynfekcyjny o właściwościach myjących. Nadaje się do nasączenia mat dezynfekcyjnych.

WŁAŚCIWOŚCI

Virkon wykazuje działanie bakteriobójcze, wirusobójcze i grzybobójcze. Preparat jest produkowany w postaci jasnoróżowego proszku, dobrze rozpuszczalnego w letniej wodzie. W stężeniach roboczych nie posiada właściwości drażniących, jest mało toksyczny i nie powoduje odczynów alergicznych. Może być stosowany w obecności zwierząt. Nie niszczy odkażanych powierzchni i sprzętu. W środowisku ulega biodegradacji. Roztwory użytkowe posiadają odczyn kwaśny (pH 1% roztworu = 2,6).

STOSOWANIE

Virkon jest dezynfektantem zalecanym do mycia i dezynfekcji:

- podłóg, ścian oraz wyposażenia w pustych pomieszczeniach inwentarskich;
- odkażania pomieszczeń w obecności zwierząt (zalecany szczególnie w drobiarstwie i hodowli trzody chlewnej);
- dezynfekcji środków transportu dla zwierząt;
- odkażania wyposażenia weterynaryjnego i zootechnicznego wykonanego z różnych metali, wszystkich rodzajów tworzyw sztucznych oraz gumy;
- odkażania jaj wylęgowych.

Powierzchnia powinna być spryskana preparatem i pozostawiona do wyschnięcia. W tym czasie efekt biobójczy zostanie uzyskany. W przypadku gdy, wymagane jest płukanie powierzchni wodą, pozostawić na 30 minut. Po zakończeniu procesu dezynfekcji, dobra praktyka zabezpieczenia biologicznego nakazuje, aby wszystkie drzwi pozostały zamknięte a maty do dezynfekcji obuwia umieszczone przy każdym wejściu. Ponowne wejście do pomieszczenia jest możliwe dopiero po

wyschnięciu dezynfekowanego pomieszczenia. Zaleca się odczekanie 30minut po zamgławianiu, przed wejściem personelu bez środków ochrony osobistej.

OPAKOWANIE

- 200 g

Tabela stężeń preparatu Virkon® S do dezynfekcji powierzchni

Dezynfekcja powierzchni	Ilość wody	Ilość proszku Virkon® S niezbędna do otrzymania 1% roztworu (10 g/l)
50 m ²	15l	150 g
100 m ²	30l	300 g
500 m ²	150l	1,5 kg
1000 m ²	300l	3 kg
2500 m ²	750l	7,5 kg

ZASOSOWANIE	STĘŻENIE	SPSÓB UŻYCIA	CZĘSTOTLIWOŚĆ
rutynowa dezynfekcja wszystkich powierzchni wyposażenia	1% (10g/l)	Stosując urządzenie ciśnieniowe lub inne urządzenie spryskujące, nanieść roztwór preparatu Virkon S w ilości 300ml/m ² na powierzchnię, a także na wyposażenie, aż do całkowitego zmoczenia wyposażenia.	Po zakończeniu każdego cyklu produkcyjnego; na powierzchnie i wyposażenie w pomieszczeniach dla zwierząt. Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji): kluczowe powierzchnie na zewnątrz pomieszczeń dla zwierząt, np. korytarze.
dezynfekcja obuwia i kół pojazdów	1% (10g/l)	Wlać roztwór do odpowiedniego pojemnika. Wymienić, gdy jest zanieczyszczony lub po upływie 4-5 dni od przygotowania.	Ciągle. Przy każdym wjeździe i wyjściu na fermę produkcyjną i przy wejściach do budynków.
zamgławianie dezynfekcja za pomocą spryskiwania	1% (10g/l)	Stosować urządzenie ciśnieniowe lub spryskiwacz plecakowy. Dozować 1 L roztworu na 10m ² powierzchni podłogi.	W czasie ustalania procedury dla pomieszczenia, przed wprowadzeniem żywego inwentarza.
zamgławianie na zimno	1% (10g/l)	Przy użyciu zamgławiacza mechanicznego dozować 1 L roztworu preparatu Virkon S na 10m ² powierzchni podłogi.	Rutynowo (codziennie lub jako element systemu kontroli infekcji); kluczowe strefy dostępu, np korytarze wewnętrzne.

Uwaga!

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu

Zagrożenia

H315 - Działa drażniąco na skórę.

H318 - Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

H412 - Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

P102 - Chronić przed dziećmi.

P280 - Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P273 - Unikać uwolnienia do środowiska.

P305+P351+P338 - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

P310 - Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem.

P501 - Zawartość/pojemnik usuwać do uprawnionych firm utylizacji odpadów niebezpiecznych zgodnie z przepisami krajowymi.

EUH208 - Zawiera peroksodisiarczan(VI) dipotasu, dipenten. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zawiera: Bis(peroksomonosiarczano) bis(siarczan)pentapotasu, peroksodisiarczan(VI) dipotasu, dipenten

W przypadku rozproszenia może tworzyć wybuchową mieszaninę pyłowo-powietrzną. Podczas pracy z produktem może powstać pył, który może powodować mechaniczne podrażnienie oczu, skóry, nosa i gardła.

