

Link do produktu: <https://sklep.pesan.pl/virocid-f-10-l-preparat-dezynfekujacy-p-75.html>



VIROCID F 10 L - preparat dezynfekujący

Cena brutto	1 012,72 zł
-------------	--------------------

Cena netto	937,70 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Czas wysyłki	24 godziny
--------------	-------------------

Producent	CID LINES
-----------	------------------

Opis produktu

VIROCID F 10 L - preparat dezynfekujący

WŁAŚCIWOŚCI

VIROCID F stanowi synergistyczne połączenie czwartorzędowych soli amonowych oraz aldehydu glutarowego. VIROCID F działa bakterio-, grzybo- i wirusobójczo.

SPOSÓB UŻYCIA

Przed zastosowaniem należy dokładnie umyć dezynfekowane powierzchnie.

Dezynfekcja:

- **zamgławianie:** 1 litr VIROCID F + 3 litry wody / 1000 m³
- **oprysk** (działanie prewencyjne) 0,5%
- Czas kontaktu 30 minut.

Uwaga

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Zagrożenia

H226 Łatwopalna ciecz i pary

H302 Działa szkodliwie po połknięciu

H314 Powoduje poważne oparzenia skóry i uszkodzenia oczu

H317 Może powodować reakcje alergiczne skóry
H334 Może powodować objawy astmy lub trudności w oddychaniu w następstwie wdychania
H400 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
P260 Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P303 W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Umyć dużą ilością wody z mydłem.
P304+P340 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem. Pilnie zastosować określone leczenie.
P305 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ /lekarzem. Zastosować określone leczenie.
P301+P330+P331+P310+P321 W PRZYPADKU POŁKNIECIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem. Zastosować określone leczenie.
Zawiera: Aldehyd glutarowy, chlorek didecyloдимetyloamonium, chlorek dimetylobenzalkonium.

